

漢方専門なつめ薬局の乙字湯

乙字湯は、「叢桂亭医言小言」に収録されている、痔疾患に用いられる漢方薬です。

してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)
- 次の人は服用しないでください
生後3カ月未満の乳児。
 - 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬（下剤）
 - 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
(5) 高齢者。
(6) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
(7) 次の症状のある人。
むくみ
(8) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
下痢

効能・効果

大便秘がたくて便秘の傾向にあるものの次の諸症：痔核（いぼ痔）、きれ痔、便秘

成分と分量

1包（大人1日量）中に次の成分を含んでいます。

成 分	トウキ	サイコ	オウゴン	カンゾウ	ダイオウ	ショウマ
分 量	6.0g	5.0g	3.0g	2.0g	0.5g	1.5g

用法・用量

煎液を3回に分けて食前・食間に服用してください（1回分ずつパックになっています）。

上記は大人の1日量です。

年 齢	大人(15才以上)	14才～7才	6才～4才	3才～2才	2才未満	3カ月未満
服用量	上記の通り	大人の2/3	大人の1/2	大人の1/3	大人の1/4以下	服用しないこと
1日服用回数	3回					

＜用法・用量に関連する注意＞

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異を生じることがあります。

■お問い合わせ先

漢方専門 なつめ薬局

電話：011-206-9759（受付日時：木曜日～月曜日の 11:00～18:00）

メール：info_ec@sevenall.jp

製造販売元

漢方専門 なつめ薬局

北海道札幌市中央区南 6 条西 11 丁目 1285-9